

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 10. oktober 2018

Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS.

Rekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger viser en prioritering baseret alene på lægemiddelpriis og ikke totalomkostninger.

"Fagudvalgets sammensætning" benævner det RADS-fagudvalg, som udarbejdede den behandlingsvejledning, der danner grundlag for lægemiddelrekommandationen. Fagudvalget har ikke været inddraget i Medicinrådets opdatering af lægemiddelrekommandationen.

Gældende fra	1. januar 2019	Version: 2.3 Dokumentnr.: 27010 Offentliggjort: oktober 2018
---------------------	----------------	--

Ændringslog

Version	Dato	Godkendt af	Ændring
1.0	November 2013	RADS	Offentliggørelse
1.1	Oktober 2013	RADS	Børneskema (voriconazol dosisændring)
1.2	Februar 2013	RADS	Opdateret jf. behandlingsvejledning version 1.3
2.0	Sept. 2016	RADS	2. vurdering (baseret på baggrundsnotaterne 227580, 227581 og 227582)
2.1	August 2017	Medicinrådet	Opdateret ift. anidulafungin og caspofungin som konsekvens af to patentudløbsudbud gældende hhv. 01.08.17-31.12.17 og 01.01.18-31.03.18. Der er ingen ændring i rekommendationen som følge af de nye udbud.
2.2	Februar 2018	Medicinrådet	Opdateret på baggrund af nyt Amgros udbud gældende pr. 1. april 2018. Der er heraf følgende ændringer i rekommendationen: Caspofungin (Cancidas) erstatter anidulafungin (Ecalta) hvor et echinocandin anbefales som 1. valg i behandlingen af "præemptiv og empirisk behandling mod gærsvampeinfektion" og "dokumenteret gærsvampeinfektion". Fluconazol "Aurobindo" kapsler erstatter Fluconazol "Stada" kapsler. Voriconazole "Sandoz" tabletter erstatter Vfend tabletter. Itraconazol "2care4" kapsler erstatter Niddazol kapsler. Itraconazol suspension er pr. 1/1-18 udgået fra det danske marked. Daglig dosering itraconazol po er ændret fra "200 mg x 2, ved kapsler: 1-7 dage 400 mg x 2" til "200 mg x 2"

			(kan øges op til 400 mg x 2 afhængig af serumitraconazol)"
2.3	Oktober 2018	Medicinrådet	Opdateret på baggrund af nyt Amgros udbud gældende pr. 1. januar 2019. Der er følgende ændringer i rekommendationen: Anidulafungin (Ecalta) erstatter caspofungin (Cancidas) hvor et echinocandin anbefales som 1. valg i behandlingen af "præemptiv og empirisk behandling mod gærsvampeinfektion" og "dokumenteret gærsvampeinfektion".

IKKE LÆNGERE
GÆLDENDE

Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger.

Målgruppe	Relevante afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Andre relevante interessenter
Udarbejdet af	Fagudvalget vedr. systemisk antimykotisk behandling under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Formål

Formålet med RADS behandlingsvejledninger er at sikre national konsensus om behandling med lægemidler; herunder at definere hvilke lægemidler der anses for ligestillede. Formålet med RADS lægemiddelrekommandationer er at konkretisere behandlings- vejledningerne med de anbefalede lægemidler og konkrete produkter, der skal anvendes.

Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af de tre baggrundsnotater, der foreligger for systemisk antimykotisk behandling. Baggrundsnotaterne er fordelt på følgende patientgrupper:

1. Immunsupprimerede hæmatologiske patienter, inkl. børn
2. Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensiv terapiafdeling, inkl. børn
3. Organtransplanterede patienter, inkl. børn

Målgruppen

Målgruppen for systemisk antimykotisk behandling er patienter behandlet på hospital i risiko for, under mistanke om, eller havende dokumenteret svampeinfektion. Behandlingen af patienterne er vurderet generelt med fokus på gær- og skimmelsvampe.

Konklusion vedr. lægemidlerne

Behandling af dokumenteret gærsvampeinfektion

Ved dokumenteret invasiv candidiasis bør behandlingen indledes med et echinocandin som 1. valg. Efter ca. 5 dages behandling, kan der deeskaleres til en mere smalspektret behandling med fluconazol, hvis der er klinisk fremgang, og artsbestemmelse og/eller resistensundersøgelse giver mulighed herfor. Ved invasiv candidiasis forårsaget af azol-resistente gærsvampe fortsættes echinocandin-behandlingen.

Liposomal amphotericin B kan overvejes ved den initiale behandling af invasiv *Candida* infektion som 2. valg i stedet for echinocandiner.

Behandlingsvarigheden ved invasiv candidiasis er minimum 2 uger efter sidste positive dyrkningsfund.

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Anidulafungin	100 mg x 1 (1. dag 200 mg x 1), iv	Ecalta iv
Overvej (Svag anbefaling for)	Liposomal amphotericin B	3 mg/kg x 1, iv	AmBisome iv
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)	Fluconazol Voriconazol	400 mg x 1 (1. dag 800 mg x 1), po/iv 4 mg/kg x 2 (1. dag 6 mg/kg x 2), po/iv	Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend iv Vfend pulver til oral suspension
Anvend ikke (Stærk anbefaling imod)	Echinocandiner ved mistanke om fokus i CNS		

Behandling af dokumenteret azol-følsom gærsvampeinfektion

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Fluconazol	400 mg x 1 (1. dag 800 mg x 1), po/iv	Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv
Overvej (Svag anbefaling for)	Anidulafungin Caspofungin Liposomal amphotericin B Voriconazol	100 mg x 1 (1. dag 200 mg x 1), iv 50 mg x 1 (1. dag 70 mg x 1), iv (patienter >80 kg: 70 mg x 1, iv) 3 mg/kg x 1, iv 4 mg/kg x 2 (1. dag 6 mg/kg x 2), po/iv	Ecalta iv Cancidas iv AmBisome iv Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend iv Vfend pulver til oral suspension
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)			
Anvend ikke (Stærk anbefaling imod)	Echinocandiner ved mistanke om fokus i CNS		

Behandling af mistænkt eller dokumenteret skimmelsvampeinfektion

Til patienter med mistænkt eller dokumenteret aspergillose behandles initialt med voriconazol eller isavuconazol. Ved ikke akut/invasiv aspergillose eller som konsoliderende behandling af påviste itraconazol-følsomme skimmelsvampe kan skiftes til målrettet behandling med itraconazol.

Liposomal amphotericin B kan overvejes som 2. valg til behandlingen af aspergillose, og bør foretrækkes som 1. valg ved mistanke om ikke-*Aspergillus* betinget skimmelsvampeinfektioner. Der bør tages serumkoncentrationsmålinger for at sikre effekten af behandlingen.

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Voriconazol	4 mg/kg x 2 (1. dag 6 mg/kg x 2), po/iv	Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend iv Vfend, pulver til oral suspension
Overvej (Svag anbefaling for)	Liposomal amphotericin B	3 mg/kg x 1, iv	AmBisome iv
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)	Itraconazol Posaconazol Echinocandiner	200 mg x 2 (kan øges op til 400 mg x 2 afhængig af serum-itraconazol), po 300 mg x 1 (1. dag 300 mg x 2), po	Itraconazol "2care4" kapsler Noxafil enterotabletter
Anvend ikke (Stærk anbefaling imod)	Fluconazol		

Behandling af kryptokokkose

Ved kryptokokkose anbefales som 1. valg initial behandling med liposomal amphotericin B i kombination med flucytosin og efterfølgende konsolidationsbehandling med fluconazol.

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Liposomal amphotericin B og flucytosin	3-5 mg/kg, iv og 25 mg/kg x 4, po/iv	Ambisome iv og flucytosin (IRS)*
Overvej (Svag anbefaling for)	Liposomal amphotericin B og fluconazol	3-5 mg/kg, iv og 800-1200 mg x 1, iv	Ambisome og Fluconazol "Fresenius Kabi" iv
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)			
Anvend ikke (Stærk anbefaling imod)	Echinocandiner		

*IRS: Ikke registreret specialitet

Immunsupprimerede hæmatologiske patienter

Profylakse til akut leukæmi/MDS i højeste risiko

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Posaconazol enterotabletter	300 mg x 1 (1. dag 300 mg x 2), po	Noxafil enterotabletter
Overvej (Svag anbefaling for)	Itraconazol	200 mg x 2 (kan øges op til 400 mg x 2 afhængig af serum-itraconazol), po	Itraconazol "2care4" kapsler

RADS anbefaler liposomal amphotericin B som 1. valgs præparat, hvis man mistænker anden skimmelsvamp end *Aspergillus*.

Profylakse ved allogen HSCT uden betydende immunsuppression

		Dosering - dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Fluconazol	400 mg x 1, po	Fluconazol "Aurobindo" kapsler
Overvej (Svag anbefaling for)	Posaconazol enterotabletter Itraconazol	300 mg x 1 (1. dag 300 mg x 2), po 200 mg x 2 (kan øges op til 400 mg x 2 afhængig af serum-itraconazol), po	Noxafil enterotabletter Itraconazol "2care4" kapsler

Profylakse ved allogen HSCT i steroid behandling

		Dosering – dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Posaconazol enterotabletter	300 mg x 1 (1. dag 300 mg x 2), po	Noxafil enterotabletter
Overvej (Svag anbefaling for)	Voriconazol	200 mg x 2 (1. dag 400 mg x 2), po	Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend pulver til oral suspension
	Itraconazol	200 mg x 2 (kan øges op til 400 mg x 2 afhængig af serum-itraconazol), po	Itraconazol "2care4" kapsler

Empirisk behandling af patienter med neutropeni og feber efter mindst 4 dages bredspektret antibakteriel behandling

Der anbefales empirisk behandling til hematologiske patienter:

- Vedvarende feber ($tp >38^{\circ}C$) uden fokus trods flere dages (>4 dage) bredspektret antibiotikabehandling og en af nedenstående risikofaktorer:
 - 3 Forventet længerevarende neutropeni (varighed >10 dage, antal neutrofile granulocyetter $<0,5 \times 10^9/L$) ○
Glukokortikosteroidbehandling
 - 4 Allogen HCT (Hæmatopoietisk celletransplantation)
 - 5 Tidligere behandling med lægemidler med langvarig T-celle suppression til følge

Ved mistanke om andre skimmelsvampe end *Aspergillus*, anvendes liposomal amphotericin B som 1. valgs præparat.

		Dosering – dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Caspofungin	50 mg x 1 (1. dag 70 mg x 1), iv (For patienter >80 kg: 70 mg x 1, iv)	Cancidas iv
Overvej (Svag anbefaling for)	Liposomal amphotericin B	3 mg/kg iv x 1	AmBisome iv

Kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger

Profylakse med fluconazol imod invasive gærinfektioner hos kritisk syge patienter anvendes ved gastrointestinal perforation, pancreatitis og lignende kritiske tilstande eller signifikant forhøjede risikoscores.

Profylakse mod gærsbampeinfektion hos kritisk syge patienter

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Fluconazol	400 mg x 1 (1. dag 800 mg x 1) po/iv	Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv
Overvej (Svag anbefaling for)	Anidulafungin Caspofungin	100 mg x 1 (1. dag 200 mg x 1), iv 50 mg x 1 (1. dag 70 mg x 1), iv (patienter >80 kg: 70 mg x 1, iv)	Ecalta iv Cancidas iv

Præemptiv og empirisk behandling mod gærsbampeinfektion hos kritisk syge patienter

Som præemptiv og empirisk antimykotisk behandling af kritisk syge patienter med risikofaktorer og/eller tegn på pågående gærsbampeinfektion (påviste surrogatmarkører) anbefales initialbehandling med et echinocandin som 1. valg.

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Anidulafungin	100 mg x 1 (1. dag 200 mg x 1), iv	Ecalta iv
Overvej (Svag anbefaling for)	Fluconazol	400 mg x 1 (1. dag 800 mg x 1) po/iv	Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)	Liposomal Amphotericin B	3 mg/kg x 1, iv	AmBisome iv

Præemptiv og empirisk behandling mod skimmelsvampeinfektion hos kritisk syge patienter

Som præemptiv og empirisk antimykotisk behandling af kritisk syge patienter med risikofaktorer og/eller tegn på pågående skimmelsvampeinfektion (påviste surrogatmarkører og/eller billeddannelsespåvisning) anbefales voriconazol som 1. valg.

		Dosering dagligt	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Voriconazol	4 mg/kg x 2 (1. dag 6 mg/kg x 2), po/iv	Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend iv Vfend pulver til oral suspension
Overvej (Svag anbefaling for)	Liposomal Amphotericin B	3 mg/kg x 1, iv	AmBisome iv

Organtransplanterede patienter Lungetransplantation

Profylakse i 3 måneder til lungetransplanterede patienter med minimum én risikofaktor

		Dosis	Handelshavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Posaconazol enterotablet i kombination med liposomal amphotericin B som inhalation	300 mg x 1, po 25 mg x 1, inhalation	Noxafil enterotablet i komb. med AmBisome som inhalation
Overvej (Svag anbefaling for)	Voriconazol i kombination med liposomal amphotericin B som inhalation	200 mg x 2, po 25 mg x 1, inhalation	Voriconazole "Sandoz" tabletter eller Vfend pulver til oral suspension i komb. med AmBisome som inhalation
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)	Liposomal amphotericin B	3 mg/kg, iv	AmBisome iv

Profylakse i 2 måneders cyklus til alle lungetransplanterede patienter med fund af bronkial kolonisation og/eller superficielle svampeinfektioner

		Dosis	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Posaconazol enterotablet i kombination med liposomal amphotericin B som inhalation	300 mg x 1, po 25 mg x 1, inhalation	Noxafil enterotablet i komb. med AmBisome som inhalation
Overvej (Svag anbefaling for)	Voriconazol i kombination med liposomal amphotericin B som inhalation	400 mg x 2, po 25 mg x 1, inhalation	Voriconazole "Sandoz" tabletter eller Vfend pulver til oral suspension i komb. med AmBisome som inhalation
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)	Liposomal amphotericin B	3 mg/kg, iv	AmBisome iv

Levertransplantation

Til de levertransplanterede patienter med minimum en risikofaktor, anbefales stærkt for anvendelsen af profylakse med anidulafungin under intensiv behandling, og ved transplantationskomplikationer, der oftest behandles i 5 dage.

Profylakse til levertransplanterede patienter med minimum én risikofaktor under intensive forløb

		Dosis	Handelsnavn
Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for)	Anidulafungin*	100 mg x 1 (1. dag 100 mg x 2), iv	Ecalta iv
Overvej (Svag anbefaling for)	Liposomal amphotericin B	3 mg/kg x 1, iv	AmBisome iv
Anvend ikke rutinemæssigt (Svag anbefaling imod)	Fluconazol	400 mg x 1, po/iv	Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv

* Kræver kontrol af serumniveauer af calcineurinhæmmere ved samtidig anvendelse.

Hjerte og nyretransplantation

Der anbefales ikke rutinemæssig anvendelse af antimykotisk profylakse ved hjertetransplantationer eller nyretransplantationer.

Børn

Ikke alle antimykotika er godkendt til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen.

Neonatale			
Indikation	Behandlingsstrategi	Valg (præparat, dgl. dosis (medmindre andet er angivet), adm. vej)	Handelsnavn
<1 kg og/eller <27. gestationsuge og med behov for intravenøs terapi og invasiv procedure	Gærsepsis profylakse, hvis candidæmi incidens tilskriver dette	<p>1. valg: fluconazol 3 mg/kg x 2, po/iv, ugentligt</p> <p>1. valg: liposomal amphotericin B 2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt</p>	Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv AmBisome iv
Gærsepsis	Målrettet	liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg x 1, iv	AmBisome iv

Ikke alle antimykotika er godkendt til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen.

Børn < 15 år med en række sygdomme (AML, ALL i dexamethazon, ALL-HR, Recidiv ALL, AML, NHL, B-ALL, B-NHL (gr. 2,3,4), LCAL, Neuroblastom st M, Svær aplastisk anæmi, allogen stamcelle-transplantation, Non-B-NHL i dexamethazon, forventet neutropeni > 2 uger)			
Indikation	Behandlingsstrategi	Valg (præparat, dgl. dosis adm. vej)	Handelsnavn
Systemisk gær- og aspergillusinfektion	Profylakse Gives under hele behandlingen til 4 uger efter marvregeneration efter sidste behandling	<u>1. valg:</u> posaconazol, po <u>1. valg:</u> voriconazol, po/iv <u>Alternativt valg:</u> lipid-amphotericin B x 2, ugentligt (under ALL behandlinger, hvor barnet behandles med ugentlig vincristin)	Noxafil, oral suspension Vfend iv Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend pulver til oral suspension AmBisome iv
Neutropeni er leukocytter $\leq 0,5 \times 10^6/\text{ml}$, og febrilia i >4 dage på et bredspektret antibiotika (som fortsættes)	Empirisk ved neutropen febrilia	Hvis ingen forudgående profylakse <u>1. valg:</u> caspofungin x 1, iv <u>2. valg:</u> liposomal amphotericin B x 1, iv voriconazol x 2, iv/po Hvis profylakse med et azol vælges lipid-amphotericin B Hvis profylakse med lipid-amphotericin B, vælges dgl. behandling med samme	Cancidas iv AmBisome iv Vfend iv Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend pulver til oral suspension

Skemaet fortsætter på næste side

Ikke alle antimykotika er godkendt til behandling af børn. Praksis på området fremgår af tabellen.

Gærsvampeinfektion	Præemptiv/Målrettet	<u>1. valg:</u> caspofungin x 1, iv <u>2. valg:</u> lipid-amphotericin B <u>3. valg:</u> fluconazol x 2, po/iv	Cancidas iv AmBisome iv Fluconazol "Aurobindo" kapsler Fluconazol "Fresenius Kabi" iv
Skimmelsvampeinfektion	Præemptiv/Målrettet	<u>1. valg:</u> voriconazol <u>2. valg:</u> liposomal amphotericin B	Vfend iv Voriconazole "Sandoz" tabletter Vfend pulver til oral suspension AmBisome iv

Daglige doser, med mindre andet er angivet, af svampemediciner til børn

Præparat	Profylakse	Possible/Empirisk	Præemptiv og målrettet	Kommentarer
Lipid amphotericin B	2,5 mg/kg x 2, iv ugentligt	3 mg/kg x 1, iv /dag	3-5 mg/kg x 1, iv	Off label til børn <1 mdr.
Voriconazol	4 mg/kg x 2, po (max 200 mg x 2)	<u>2-12 år og 12-14 år med legemsvægt <50 kg:</u> Loading dosis 9 mg/kg, iv hver 12. time de første 24 timer efterfulgt af 8 mg/kg x 2 dagligt iv eller 9 mg/kg x 2 dagligt, po (Max. 350 mg x 2 dagligt) <u>Over 12 år:</u> 6 mg/kg x 2, iv første døgn, eller 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, eller 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po)	<u>2-12 år og 12-14 år med legemsvægt <50 kg:</u> Loading dosis 9 mg/kg, iv hver 12. time de første 24 timer efterfulgt af 8 mg/kg x 2 dagligt iv eller 9 mg/kg x 2 dagligt, po (Max. 350 mg x 2 dagligt) <u>Over 12 år:</u> 6 mg/kg x 2, iv første døgn, eller 200 mg x 2 po (vægt >40 kg: 400 mg x 2, po), derefter 4 mg/kg x 2, iv, eller 100 mg x 2, po (vægt >40 kg: 200 mg x 2 po)	Off label til børn <2 år Der savnes erfaring om doser for børn under 2 år. Pga. manglende erfaring om absorption ved anvendelse af tablet til børn anbefales brug af oral suspension
Posaconazol	5 mg/kg x 3, po (max 200 mg x 3, po, og <u>>13 år 200 mg x 3, po</u>)		<u>>13 år 200 mg x 3 po</u>	Off label til børn <18 år Skal indtages med fedtholdigt måltid. Erfaring savnes hos børn <13 år
Fluconazol	3 mg/kg x 1, po/iv	<u>>4 uger: 6 mg/kg x 2, iv 3-4 uger:</u> 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer <u>1-2 uger:</u> 6 mg/kg x 2, iv hver 72. timer	<u>>4 uger: 6 mg/kg x 2, iv 3-4 uger:</u> 6 mg/kg x 2, iv hver 48. timer <u>1-2 uger:</u> 6 mg/kg x 2, iv hver 72. timer	
Caspofungin		<u>3 md.-15 år:</u> første døgn 70 mg/m ² x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m ² x 1, iv (max 70 mg) <u>0-3 mdr.:</u> 25 mg/m ² x 1, iv	<u>3 md.-15 år:</u> første døgn 70 mg/m ² x 1, iv (max 70 mg), derefter 50 mg/m ² x 1, iv (max 70 mg) <u>0-3 mdr.:</u> 25 mg/m ² x 1, iv	Effekt og sikkerhed ikke tilstrækkeligt undersøgt for børn <12 mdr.
Micafungin	1 mg/kg x 1, iv (max 50 mg, og ved vægt >40 kg: 50 mg x 1)	2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: 100-200 mg x 1) <u>Præmature:</u> 15 mg/kg x 1, iv	2-4 mg/kg x 1, iv (max 100 mg, og ved vægt >40 kg: 100-200 mg x 1) <u>Præmature:</u> 15 mg/kg x 1, iv	Begrænset erfaring for børn <2 år
Anidulafungin	0,75 mg/kg x 1, iv (max 50 mg)	1,5 mg/kg, iv (max 100 mg)	1,5 mg/kg, iv (max 100 mg)	Off label til børn <18 år

Kriterier for igangsætning af behandling

1. Ved direkte påviste svampe i relevante prøvematerialer fra patienter med infektion
2. Ved indirekte påvisning af svampeinfektion, ved relevante biomarkører og/eller billeddiagnostik, hos patienter med mistænkt svampeinfektion
3. Som profylakse til patienter der har risikofaktorer og/eller der behandles således, at de udsættes for risiko for svampeinfektioner

Monitorering af effekten

Den kliniske vurdering, understøttet af infektionsparametre, eventuelle biomarkører og billeddannelser, er afgørende for vurderingen af, om effekten af behandlingen er svarende til det højest opnåelige for den aktuelle svampeinfektion.

Terapeutisk koncentrationsmåling (TDM) anvendes ved planlagt langvarig antimykotisk behandling.

Steady state ved peroral behandling med azoler opnås i reglen først efter 4-5 dages behandling.

Serumkoncentrationen bør ved målrettet behandling monitoreres 1-2 gange ugentligt (dog ikke nødvendigt for fluconazol), indtil relevant niveau og steady state er nået, samt ved ændring af forhold, der kan have indflydelse på serumniveauet. Herefter kan serumkoncentrationen undersøges med større intervaller.

Ved profylaktisk behandling er behovet for regelmæssig TDM mere omdiskuteret, men må generelt anbefales ved profylakse med itraconazol, voriconazol og posaconazol, især ved mistanke om manglende peroralt optag og/eller medicininteraktioner.

Anbefalede serum-koncentrationer ved steady state:

	Profylakse	Målrettet behandling
voriconazol (dalværdi)	Erfaring savnes	1-5,5 µg/ml
posaconazol (dalværdi)	≥0,7 µg/mL	≥1,0 µg/ml
isavucunazol (dalværdi)	Erfaring savnes	Erfaring savnes
itraconazol (dalværdi)	≥0,5 µg/mL	≥1,0 µg/ml
flucytosin (dalværdi)	Ej relevant	≥20-40 µg/ml
flucytosin (peakværdi)	Ej relevant	≥60-80 µg/ml

Kriterier for skift af behandling

Der er ingen faste kriterier for skift af behandling, men behandlingen kan skiftes som følge af:

- manglende antimykotisk dækning af aktuelle svampefund af den empiriske eller præemptive behandling
- gennembrudsinfektion under antimykotisk profylakse
- manglende effekt mod en pågående infektion som kan skyldes farmakokinetiske forhold, som manglende penetration af antimykotikum til fokus
- interaktioner med andre lægemidler, ved bl.a. insufficient terapeutisk niveau (TDM) - uacceptable bivirkninger
- persisterende fund af svampe i bloddyrkninger eller i prøver fra andre normalt sterile områder; fx fra spinalvæske ved kryptokokkose
- forværring af de radiologiske forandringer (aspergillose).

Det anvendte antimykotika kan ændres fra intravenøs administration til et peroralt præparat, når den infektiøse svamp er identificeret og resistensmønsteret er kendt, et sandsynligt fokus er identificeret og eventuelle intravenøse katetre skiftet, og når patienten ikke er kritisk syg.

Målrettet behandling af invasiv candidiasis indledes hos **kritisk** syge patienter altid med et echinocandin. Ved dokumenteret fluconazol **følsomt** isolat kan der deeskaleres til fluconazol efter 5 dages behandling med echinocandin ved kliniske tegn på fremgang, vedvarende negative (blod) dyrkningsfund og ikke påviste sekundære svampefoci.

Kriterier for seponering af behandling

Invasiv candidiasis

Behandlingslængden af invasiv candidiasis anses generelt til at være minimum 14 dages behandling efter sidste positive dyrkning, hos patienter uden betydende persisterende neutropeni eller svær immunsuppression.

Tidligt kateterskift og fjernelse af andre potentielt inficerede fremmedlegemer er afgørende for hurtigere sanering af infektion og medfører reduceret mortalitet. Såfremt der udelukkende er tale om kateterassocieret infektion kan behandlingslængden dog oftest begrænses til få dage, efter kateteret er skiftet eller fjernet.

I særlige tilfælde som *Candida*-endokarditis, -endophtalmitis, -osteomyelitis, -mediastinitis, eller ved protese-/fremmedlegeme associeret infektion, hvor protesen eller fremmedlegemet ikke kan fjernes operativt, er den anbefalede behandlingslængde minimum 6 uger og kan i nogle tilfælde være livsvarig, pga. *Candida* biofilmdannelse.

Invasiv aspergillose

Oftest anbefales 6-12 ugers behandling. I praksis vil en betydelig del af patienter med invasiv aspergillose kræve længere behandling og sekundær *Aspergillus* profylakse, specielt ved fortsat/gentagen immunsuppression/neutropeni. Respons på behandling bør evalueres forløbende via klinik, radiologisk respons f.eks. ved pulmonal aspergillose gentagne HRCT-scanninger, samt om muligt via surrogatmarkører (f.eks. faldende *Aspergillus* galaktomanan). Graden af immunsuppression er helt afgørende for behandlingsrespons og længde af

behandling, hvorfor medikamentelt induceret immunsuppression bør begrænses så meget som muligt (f.eks. dosisreduktion eller seponering af glukokorticoid).

Kryptokokkose

Ved kryptokok meningitis, som hyppigst ses ved svær HIV-relateret immunsuppression, anvendes som standard initialt kombinationsbehandling med liposomalt amphotericin B og flucytosin i minimum 2 uger efterfulgt af minimum 8 ugers højdosis fluconazol (400-800 mg/dag) efterfulgt af en lavere dosis af fluconazol (200-400 mg/dag) i minimum 6-12 mdr. Ved persistende immundefekt/lavt CD4-tal fortsættes sekundær fluconazol profylakse i reglen indtil adækvat bedring af immunsuppressionen, f.eks. som følge af HIV-behandling.

Immunsupprimerede hæmatologiske patienter

Ved neutropen feber:

Behandlingen fortsættes indtil neutropenien er ophævet. Herefter er der tre hyppige situationer:

- Der er svind af symptomer, billeddiagnostiske og blodprøvefund, og der har ikke været overbevisende tegn på svampeinfektion (påvist eller mistænkt) – i så fald seponeres behandlingen, og der er ikke behov for sekundær profylakse
- Der er svind af symptomer, billeddiagnostiske fund og blodprøvefund, og der har været overbevisende tegn på svampeinfektion (mistænkt eller påvist). Her fortsættes behandlingen indtil 1-2 mdr. efter afsluttet kemoterapi
- Der er fortsat symptomer, billeddiagnostiske fund eller blodprøvefund tydende på infektion, men ikke overbevisende tegn på at dette netop er en svampeinfektion (mistænkt eller påvist), da vil behandlingen typisk fortsættes indtil patienten klinisk fremtræder uden infektion. Hvor længe og om der skal gives sekundær profylakse beror på en individuel vurdering.

Allogent transplanterede:

- I standardiserede forløb seponeres svampeprofylaksen efter minimum 75 dage hos patienter, som ikke tidligere har fået påvist IFI og som ikke er i behandling med steroid for GvHD.
- Patienter med steroid-krævende GvHD kan som tommelfingerregel få seponeret skimmelprofylaksen, når prednisolon dosis er vedvarende reduceret til <25 mg dgl. og der ikke har været forudgående IFI.

Hos alle patienter, hvor man ikke er sikker på det infektiøse agens, foretages jævnlig revurdering inkl. relevant diagnostik.

Fagudvalgets sammensætning

Fagudvalgets sammensætning	
	Jenny Dahl Knudsen , Formand og overlæge, dr.med., Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden
	Paw Jensen , Ledende overlæge, Region Nordjylland
	Bendt Nielsen , Overlæge, dr.med., Region Midtjylland
	Jens Schierbeck , Overlæge, Region Syddanmark
	Henrik Friis , Ledende overlæge, Region Sjælland
	Nanna Reiter , Afdelingslæge, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv medicin
	Lone Smidstrup Friis , Overlæge, ph.d., Dansk Hæmatologisk Selskab
	Allan Rasmussen , Overlæge, Dansk Gastroenterologisk Selskab
	Jannik Helweg-Larsen , Overlæge, dr.med., Dansk Selskab for Infektionsmedicin.
	Martin Iversen , Overlæge, dr.med., Dansk Transplantationsselskab
	Henrik Schrøder , Overlæge, dr.med., Dansk Pædiatrisk Selskab
	Kirstine Moll Harboe , 1. reservelæge, ph.d., Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
	Maiken Cavling Arendrup , Overlæge, ph.d., Statens Serum Institut
	Anne Skyggedal , Farmaceut, Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
	Ulrich Stab Jensen , overlæge, ph.d., Faglig sekretær, inviteret af formanden